

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari telaah beberapa jurnal yang didapatkan peneliti, menyebutkan bahwa kemampuan ROM (Range Of Motion) dalam kekuatan otot pasien stroke non hemoragik yang menjalani hlatihan ROM (Range Of Motion) masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman pasien dan keputusan pasien terhadap penyakitnya.

B. SARAN

1. Bagi Rumah sakit

Sebagai masukan untuk pelaksanaan ROM (Range Of Motion) dapat dilakukan dan dipertahankan sesuai prosedur di rumah sakit, pelaksanaan dapat dilakukan minimal 2 kali sehari.

2. Bagi Pendidikan Keperawatan

Sebagai masukan dalam proses pembelajaran terutama melalui penelitian mengenai pengaruh ROM pasif terhadap perubahan sudut sendi siku pada pasien stroke non hemoragik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan latihan ROM pasif dengan mengkombinasikan dengan intervensi lain untuk pasien stroke, serta penambahan jumlah responden dan waktu pemberian ROM yang lebih lama.